ଆମର ଶକ୍ତି
କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ

ଆତ୍ମା, କୋରାପୁଟ

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କୃଷି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ (କୃଷିମହୋତ୍ସବ - ୨୦୧୬) ଉପଲକ୍ଷେ
ସଂପ୍ରସାରଣ ସଂସ୍କାର ଯୋଜନାରେ ୩୦୦୦ ଖଣ୍ଡ ମୁଦ୍ରିତ ।

pdatmakoraput@rediffmail.com /
atmakoraput/rmckoraput/e-nam.nic.in

ଧ୍ରଙ୍ଗରି ଛତୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ

ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ବ୍ୟାଗ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବା ଉପାଦାନ ଯଥା- ନଡା, ସ୍ପନ୍, ସିଝା ଗଵମ ଓ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦରକାର ।

୧) କାଠି ବା ଲୁହା ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ପନ୍ ବୋତଲ ଭିତରକୁ ଖେଞ୍ଚି ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ । ସେହି ମଞ୍ଜିକୁ ୬ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ।

୨) ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ଦରସିଝା ଗଵମକୁ ୬ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

୩) ପଲିଥିନ୍ ମୁଣିର ତଳ ଅଂଶକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟବସାୟିକ ଛତୁ ଚାଷ

୪) ପଲିଥିନର ତଳଭାଗରେ ୬ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ନଡା ପକାଇ ହାତରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ପରସ୍ତ ଉପରେ କଡରୁ ୧ ଇଞ୍ଚ ଛାଡି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସ୍ପନ ବା ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଗଵମ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ । ୨ୟ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଛଅ ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ନଡା ପକାଇ ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ନଡା ପରସ୍ତ ଉପରେ ଆଗଭଳି ଛତୁମଞ୍ଜି ଓ ଗଵମ ପକାନ୍ତୁ ।

୫) ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ନଡା ଛଅ ଇଞ୍ଚ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସ୍ପନ ବା ମଞ୍ଜିକୁ ବେଡ ଉପର ଭାଗରେ ଖେଳାଇ କରି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବଭଳି ଗଵମ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ । ତାପରେ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ବହଳର ନଡା ପକାଇ ଶେଷରେ ପଲିଥିନ୍ ମୁଣିର ମୁହଁକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ।

୬) ବାନ୍ଧିବା ପରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ବା କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ୧୦-୧୨ଟି କଣା କରନ୍ତୁ । କଣା କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି କଣା ଗୁଡିକ ମଞ୍ଜି ବା ଗଵମ ଉପରେ ନ ହେବ । କଣା ଗୁଡିକ ମଞ୍ଜି ବା ଗଵମ ଉପରେ ହେଲେ ମୂଷା ଖାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଏହି ପରି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ବୋତଲରୁ ଦୁଇଟି ବେଡ୍ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ । ବେଡ୍ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋକ ଓ ଅଳ୍ପ ପବନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ବେଡ୍‌ଗୁଡିକ କଳା ପଡି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲେ ସେଗୁଡିକ କୌଣସି କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ । ଏହିପରି ବେଡଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ ଭଲ ବେଡଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।

୭) ୨୦-୨୨ ଦିନ ଭିତରେ ଛତୁରେ ମାଇସେଲିୟମ୍ ଗୁଡିକ ମାଡି ଧଳା ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ତାପରେ ପଲିଥିନ୍ ମୁଣାରୁ ପିଣ୍ଡୁଳାଟିକୁ କାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ।

୮) ଖୋଲା ପିଣ୍ଡୁଳାଟିକୁ ନାଇଲନ୍ ଦଉଡିରେ ସିକାଭଳି କରି ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ।

୯) ପିଣ୍ଡୁଳାଟି ଟାଙ୍ଗିବା ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।

୧୦) ୨ୟ ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ୩-୪ ଥର ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।

୧୧) ପିଣ୍ଡୁଳାଟି ଟାଙ୍ଗିବା/ଝୁଲାଇବାର ୪-୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଡ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ କଡ ଆସିବାର ୩-୪ ଦିନପରେ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଛତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ।

୧୨) ଛତୁର ଧାରା ଭିତର ପଟକୁ ମୋଡି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଛତୁ ଅମଳ କରନ୍ତୁ । ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହାରିଥିବା ସମସ୍ତ ଛତୁକୁ ଏକ ସମୟରେ ତୋଳିଦେବା ଭଲ ।

୧୩) ଛତୁଗଡିକୁ ଅମଳ କରିସାରିବା ପରେ ଏକ ପାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫିମ୍ପିଗୁଡିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରାମ୍ପି ଦିଅନ୍ତୁ ।

୧୪) ପ୍ରଥମ ଅମଳ ଓ ରାମ୍ପି ଦେବା ଦିନ ବ୍ୟାଗ୍‌ଟିରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

୧୫) ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଦିନକୁ ୨-୩ ଥର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

୧୬) ପ୍ରଥମ ଅମଳର ୭-୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ ।

୧୭) ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମଳର କିଛି ଦିନ ପରେ ୩ୟ ଓ ୪ର୍ଥ ଅମଳ ଦେଇଥାଏ । ଏକ ପିଣ୍ଡୁଳାରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୫ କି.ଗ୍ରା. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତୁ ଅମଳ ମିଳେ ।

ଧିଙ୍ଗିରି ଛତୁ ଚାଷର ଲାଭ କ୍ଷତି (ଗୋଟିଏ ମୁଣା ବା ବେଡ୍‌ରୁ)

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ	ପରିମାଣ	ମୂଲ୍ୟ
୧. କଟା ନଡା	୨ କି.ଗ୍ରା	ଟ.୧୦.୦୦
୨. ଛତୁ ବିହନ	୨୦୦ ଗ୍ରା	ଟ.୧୫.୦୦
୩. ପଲିଥିନ୍ ମୁଣା(ପୁନଃବ୍ୟବହାର ହୁଏ)	୧ଟି	ଟ.୩.୦୦
୪. ସିଝା ଗଵମ	୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍	ଟ.୯.୦୦
୫. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ		ଟ.୫.୦୦

ମୋଟ ଟ୪୧.୦୦

ଅମଳ	ଦର	ଆଦାୟ
୧.୫ କି.ଗ୍ରା.	ଟ.୧୦୦.୦୦	ଟ.୧୫୦.୦୦

ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟ.୪୧.୦୦ ଲାଭାଂଶ-ଟ.୧୦୯.୦୦

କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ :

୧) ଅମଳ କରିବା ପରେ ଛତୁ ଗୁଡିକ ପରିଷ୍କାର କରି ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପଲିଥିନ୍ ମୁଣାରେ ପୂରାଇ ବନ୍ଦ କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ । ଜରି ଖୋଳରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଛତୁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ।

୨) ଛତୁକୁ ଶୁଖାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖାଇପାରେ ୧୨.୪ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବା ଛତୁକୁ ୩ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖାଯାଇପାରେ ।

୩) ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଫ୍ଲାବେଲାଟସ୍, ସାପିଡସ୍, ସିଟ୍ରିନୋପେଲେଟସ ଓ ସଜୋର କାଜୁ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ।

୪) କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆଟସ, ଫ୍ଲୋରିଡା, ଏରିଞ୍ଜି, ଫ୍ଲାବେଲାଟସ୍ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣକପି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରେ ।